AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative, rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
(73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

SPV

Grandes Cultures

n°14

DIRECTEUR-GERANT : B. MORIN
N° de série : 469
Numero d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD
Regie de Recettes de la D.D.A. C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17
ABONNEMENT ANNUEL : 100 F

Le 1er Août 1985

DLP 12-8-85546874

BETTERAVE SUCRIERE

MALADIES DU FEUILLAGE

. Situation

D'après nos observations effectuées sur près de 40 parcelles dans le PUY-DE-DOME et l'ALLIER, la situation est la suivante :

- Environ 20 % des parcelles ont reçu un traitement fongicide préventif.
- Une parcelle avec une forte attaque d'Oïdium à VERTAIZON (63).
- Une parcelle avec quelques taches de Cercosporiose à CULHAT (63), (parcelle irriguée).

* Préconisation

Visiter régulièrement vos cultures et intervenir dès l'observation des premiers symptômes d'oïdium ou de cercosporiose.

Utiliser un fongicide adapté.

Consulter notre bulletin précédent.

NOCTUELLES DEFOLIATRICES

Quelques dégâts sont notés en LIMAGNE.

Un traitement insecticide sera nécessaire en cas de forte attaque.

Utiliser un pyréthrinoïde.

MAIS

PYRALE

En cage d'élevage de MARMILHAT, les sorties maximum de papillons ont eu lieu entre le 10 et le 20 Juillet.

P. 122

Les captures aux pièges sexuels ont été importantes dans la majorité des postes vers la mi-juillet.

Dans la CREUSE, celles-ci sont devenues intenses après le 25 Juillet.

Les premiers dégâts sont visibles en LIMAGNE depuis le 26 Juillet.

Dans le PUY-DE-DOME, l'ALLIER, la CORREZE et la HAUTE-VIENNE, il est trop tard pour intervenir.

Par contre, dans la CREUSE (secteur de BOUSSAC), la protection anti-pyrale doit être effectuée très rapidement.

PUCERONS

Les populations sont faibles.

Aucun traitement ne se justifie.

CEREALES

INSECTES DES CEREALES STOCKEES

Nous vous communiquons un tract rédigé par le SPV et l'O.N.I.C.